

## Änderungen in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten für die Onkologie, Dritte Ausgabe (ICD-O3), 2. Revision

Die ICD-O-3 ist eine Klassifikation für Tumorerkrankungen. Ihr Lokalisationsschlüssel kodiert den Ort einer Neubildung, ihr Morphologie- oder Histologieschlüssel das Zellbild und das biologische Verhalten. Für die Krebsregistrierung ist die 2. Revision der ICD-O-3 von 2019 zu verwenden.

Nachstehend sind relevante Änderungen durch die 2. Revision der ICD-O-3 dargestellt, die für die Krebsregistrierung relevant sind. Bitte geben Sie in allen Meldungen an das Krebsregister Saarland an, welche Version der ICD-O-3 verwendet wurde. Bei Verwendung des Melderportals kann dies für alle Meldungen voreingestellt werden.

### Änderung des biologischen Verhaltens von Neubildungen

Für folgende Neubildungen haben sich in der 2. Revision der ICD-O-3 Änderungen im biologischen Verhalten („Behaviour“) von 0 („benigner Tumor“) oder 1 („Neoplasie fraglicher Dignität“) auf 3 („maligner Tumor“) ergeben. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

| Neubildung (Topographie)  | Schlüssel in der ICD-O-3<br>2. Revision                | Bemerkung<br>Bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel |
|---|--|---|
| Hormonproduzierende Pankreastumoren (C25.-)   | 8150/3, 8151/3, 8152/3, 8153/3, 8156/3, 8158/3, 8241/3 | Bisher mittels Schlüssel 8150/1, 8151/1, 8152/1, 8153/1, 8156/1, 8158/1, 8241/1.              |
| Keratoakanthom (C44.-)  | 8071/3   | Bisher gutartige Neubildung (ICD-10 Code L57.0).  |
| Digitales papilläres Adenokarzinom (C44.-)<br>Ekkrines papilläres Adenokarzinom (C44.-) | 8408/3   | Bisher mittels Schlüssel 8408/1 kodiert.  |
| Thymome C37.9   | 8581/3, 8582/3, 8583/3, 8584/3, 8585/3                 | Bisher mittels Schlüssel 8581/1, 8582/1, 8583/1, 8584/1, 8585/1 kodiert.                      |
| Maligner Granulosazelltumor des Ovars (C56.9)   | 8620/3   | Bisher mittels Schlüssel 8620/1 kodiert.  |
| Gastrointestinaler Stromatumor, GIST (C15.-, C16.-, C17.-, C18.-, C26.-, C48.-)         | 8936/3   | Bisher mittels Schlüssel 8936/0 oder 8936/1 kodiert.  |
| Paragangliome (C75.-)   | 8680/3, 8681/3, 8682/3, 8690/3, 8691/3, 8692/3, 8693/3 | Bisher mittels Schlüssel 8680/1, 8681/1, 8682/1, 8690/1, 8692/1, 8693/1 kodiert.              |
| Phäochromozytom (C74.-)   | 8700/3   | Bisher mittels Schlüssel 8700/0 kodiert.  |

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Epitheloides malignes<br>Hämangioendotheliom (C49.-) | 9133/3 | Bisher mittels Schlüssel 9133/1 kodiert. |
| Klarzelliges odontogenes Karzinom<br>(C41.-)         | 9341/3 | Bisher mittels Schlüssel 9341/1 kodiert. |

Für folgende Neubildungen haben sich in der 2. Revision der ICD-O-3 Änderungen im biologischen Verhalten („Behaviour“) von 3 auf 1 ergeben. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

| Neubildung (Topographie)  | Schlüssel in der ICD-O-3<br>2. Revision | Bemerkung<br>Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel |
|---|---|--|
| Hydroa-vacciniform-artiges Lymphom (84.-)   | 9725/1                                  | Bisher mittels Schlüssel 9725/3 kodiert.   |
| Primär kutanes CD4-positives klein/medium T-Zell-Lymphom  | 9709/1                                  | Bisher mittels Schlüssel 9709/3 kodiert.   |
| Polymorphe lymphoproliferative Krankheit nach Transplantation   | 9971/1                                  | Bisher mittels Schlüssel 9971/3 kodiert.   |
| Primär kutane CD4-positiv klein/medium T-Zell-lymphoproliferative Erkrankung  | 9709/1                                  | Bisher mittels Schlüssel 9709/3 kodiert.   |
| Langerhans-Zell-Histiozytose o.n.A. (C96.-)<br><br>Langerhans-Zell-Histiozytose mehrerer Knochen<br><br>Langerhans-Zell-Histiozytose nur eines Knochens | 9751/1                                  | Bisher mittels Schlüssel 9751/3 kodiert.   |

## Änderung der Morphologie-Schlüssel von Neubildungen

Für folgende Neubildungen wurden in der 2. Revision der ICD-O-3 erstmalig Morphologie-Schlüssel vergeben. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

| Neubildung   | Schlüssel in der ICD-O-3<br>2. Revision | Häufige Tumorlokalisation   |
|--|---|---|
| NUT assoziiertes Karzinom<br><br>NUT-Karzinom<br><br>NUT-Mittellinien-Karzinom | 8023/3                                  | Mittellinie, Mittelachse, Nasenhöhlen, Meidastinum, Lunge.  |
| Plattenepithelkarzinom, HPV-positiv  | 8085/3                                  | Oropharynxkarzinome (C01, C05.1, C05.2, C09.-, C10.0, C10.2, C10.3, C10.9), Hypopharynxkarzinome (C12, C13) |
| Plattenepithelkarzinom, HPV-negativ  | 8086/3                                  |   |
| Nichtmuzinöses minimal-invasives Adenokarzinom                                 | 8256/3                                  | Lunge (C34.-)   |
| Muzinöses minimal-invasives Adenokarzinom                                      | 8257/3                                  |   |
| Angio-invasives, verkapseltes follikuläres Karzinom                            | 8339/3                                  | Schilddrüse (C73.9)   |
| Seromuzinöses Karzinom   | 8474/3                                  | Ovar (C56.9)  |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| Solides papilläres Carcinoma in situ     | 8509/2 | Brust (C50.-) |
| Solides papilläres Karzinom mit Invasion | 8509/3 |               |
| Pleomorphes lobuläres Carcinoma in situ  | 8519/2 |               |

Folgende Neubildungen haben in der 2. Revision der ICD-O-3 neue Begriffe und/oder neue Morphologieschlüssel erhalten. Alle Neubildungen sind meldepflichtig.

| Neubildung (Lokalisation)   | Schlüssel in der ICD-O-3 2. Revision | Bemerkung<br>Ggf. bisher auf Grundlage der 1. Revision der ICD-O-3 verwendete Morphologieschlüssel |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>Warziges Karzinom</b><br>Kondylomatöses Karzinom<br>Warziges Basaloidkarzinom  | <b>8054/3</b>                        | Bisher mittels Schlüssel 8051/3 kodiert.<br>Bisher mittels Schlüssel 8123/3 kodiert                |
| <b>Seröses intraepitheliales Karzinom</b><br>Seröses intraepitheliales Karzinom des Endometriums (C54.1)<br>Seröses tubares intraepitheliales Karzinom (STIC) (C57.0) | <b>8441/2</b>                        | Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8148/2 kodiert.  |
| <b>Maligner solitärer fibröser Tumor</b><br>Solitärer fibröser Tumor/Hämangioperizytom, Grad 3<br>Malignes Hämangioperizytom  | <b>8815/3</b>                        | Neuer Begriff/neues Synonym.<br>Bisher mittels Schlüssel 9150/3 kodiert.                           |
| <b>Angio-invasives, verkapseltes follikuläres Karzinom (C73.9)</b>  | <b>8339/3</b>                        | Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 8330/3 kodiert.  |
| <b>Indolente T-Zell-lymphoproliferative Krankheit des Gastrointestinaltraktes (D47.7)</b>   | <b>9702/1</b>                        | Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 9970/1 und ICD-10-Diagnosecode D47.7 kodiert.              |
| <b>EBV-positives mukokutanes Ulkus (D47.7)</b>  | <b>9680/1</b>                        | Neuer Begriff. Bisher mittels Schlüssel 9970/1 und ICD-10-Diagnosecode D47.7 kodiert.              |

**Quelle:** Deutschsprachige Ausgabe der 2. Revision der ICD-O3

[https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-O-3/\\_node.html](https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-O-3/_node.html)

-----  
**Weitere Informationen:** [krebsregister.saarland.de](http://krebsregister.saarland.de)

**Kontakt:** Vertrauensstelle des Krebsregisters:  
Telefon: 0681 501-4538;  
E-Mail: [vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de](mailto:vertrauensstelle@krebsregister.saarland.de)